

Tangenten sind Geraden  $t(x) = y = m_t x + c_t$  an eine Funktion  $f(x)$  in einem Punkt  $B(x_0|f(x_0)) = B(u|f(u))$ , dem sog. Berührungspunkt. Im Berührungspunkt stimmen Funktion und Tangente in Funktionswert und Steigung überein, d.h. es gilt:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= y(x_0) = t(x_0) \\ f'(x_0) &= m_t \end{aligned}$$

Möglichkeit 1	Möglichkeit 2	Möglichkeit 3
Funktion $f(x)$ , Stelle $x_0$	Funktion $f(x)$ , Stelle $u$	Funktion $f(x)$ , Stelle $x_0$
1. Ableitung $f'(x)$	1. Ableitung $f'(x)$	1. Ableitung $f'(x)$
Funktionswert $f(x_0)$ , Steigung $f'(x_0)$	Funktionswert $f(u)$ , Steigung $f'(u)$	Ansatz: $y = mx + c$ als Tangentenformel
Einsetzen in Tangentenformel	Einsetzen in Tangentenformel	Steigung $m = f'(x_0)$
Tangente: $t: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	Tangente: $t: y = f'(u)(x - u) + f(u)$	y-Achsen-Abschnitt $c = f(x_0) - mx_0$

**Tangente**

Normalen sind Geraden  $n(x) = y = m_n x + c_n$  senkrecht zu einer Funktion  $f(x)$  in einem Punkt  $B(x_0|f(x_0)) = B(u|f(u))$ , d.h. es gilt mit der Tangentensteigung  $m_t$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= y(x_0) = n(x_0) \\ m_t \cdot m_n &= -1, \quad m_n = -\frac{1}{m_t} = -\frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

Möglichkeit 1	Möglichkeit 2	Möglichkeit 3
Funktion $f(x)$ , Stelle $x_0$	Funktion $f(x)$ , Stelle $u$	Funktion $f(x)$ , Stelle $x_0$
1. Ableitung $f'(x)$	1. Ableitung $f'(x)$	1. Ableitung $f'(x)$
Funktionswert $f(x_0)$ , Steigung $f'(x_0)$	Funktionswert $f(u)$ , Steigung $f'(u)$	Ansatz: $y = mx + c$ als Normalenformel
Einsetzen in Normalenformel	Einsetzen in Normalenformel	Steigung $m = -\frac{1}{f'(x_0)}$
Normale: $n: y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0)$	Normale: $n: y = -\frac{1}{f'(u)}(x - u) + f(u)$	y-Achsen-Abschnitt $c = f(x_0) - mx_0$

**Normale**

Ein Berührungspunkt  $B(x_0|y_0)$  zwischen zwei Funktionen  $f(x)$  und  $g(x)$  hat die Eigenschaften:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= g(x_0) = y_0 \\ f'(x_0) &= g'(x_0) \end{aligned}$$

Zur Bestimmung von Berührungspunkten ist zunächst die einfache der beiden Gleichungen nach  $x_0$  aufzulösen und  $x_0$  in die andere Gleichung zur Überprüfung der Gleichheit einzusetzen.

Schnittpunkte  $S(x_0|y_0)$ , in denen sich Funktionen  $f(x)$  und  $g(x)$  senkrecht schneiden, genügen den Eigenschaften:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= g(x_0) = y_0 \\ g'(x_0) &= -\frac{1}{f'(x_0)} \end{aligned}$$

Zur Bestimmung dieser Schnittpunkte ist zunächst die einfache der beiden Gleichungen nach  $x_0$  aufzulösen und  $x_0$  in die andere Gleichung zur Überprüfung der Gleichheit einzusetzen.