

Mathematikaufgaben

> Differenzialgleichungen

> linear, 1. Ordnung

Aufgabe: Löse die lineare Differenzialgleichung 1. Ordnung:

$$y' - (\tan x)y = 2 \sin x .$$

Lösung: I. Allgemein gilt: Eine Differenzialgleichung der Form

$$y' + f(x)y = g(x)$$

heißt lineare Differenzialgleichung 1. Ordnung mit $g(x)$ als Störfunktion. Ist $g(x) = 0$, so ist die Differenzialgleichung homogen, ansonsten inhomogen. Die homogene lineare Differenzialgleichung 1. Ordnung hat die Lösung:

$$y = C \cdot e^{-\int f(x)dx} ,$$

die inhomogene Differenzialgleichung:

$$y = \int g(x) e^{\int f(x)dx} dx \cdot e^{-\int f(x)dx} + C \cdot e^{-\int f(x)dx} .$$

II. Als Gesamtlösung der Differenzialgleichung $y' - (\tan x)y = 2 \sin x$ haben wir:

$$y = \int 2 \sin x e^{-\int \tan x dx} dx \cdot e^{\int \tan x dx} + C \cdot e^{\int \tan x dx} = 2 \int \sin x e^{\ln|\cos x|} dx \cdot e^{-\ln|\cos x|} + C \cdot e^{-\ln|\cos x|} =$$
$$2 \int \sin x \cdot \cos x dx \cdot \frac{1}{\cos x} + \frac{C}{\cos x} = -2 \cdot \frac{\cos^2 x}{2} \cdot \frac{1}{\cos x} + \frac{C}{\cos x} = -\cos x + \frac{C}{\cos x}$$

Dabei ist nach den Exponential- und Logarithmengesetzen: $e^{\ln|\cos x|} = \cos x$, $e^{-\ln|\cos x|} = \frac{1}{\cos x}$. Wei-

ter ist das Integral $\int \sin x \cdot \cos x dx$ z.B. mit Hilfe der Substitution $z = \cos x$, $z' = \frac{dz}{dx} = -\sin x$ zu

$$\text{lösen: } \int \sin x \cdot \cos x dx = -\int z dz = -\frac{z^2}{2} = -\frac{\cos^2 x}{2} .$$