

Mathematikaufgaben

> Differenzialgleichungen

> Trennung der Variablen

Aufgabe: Löse die Differenzialgleichung:

$$y' = x^2 y.$$

Lösung: I. Allgemein gilt: Eine Differenzialgleichung der Form:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y)$$

ist vermöge der unbestimmten Integrale:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$$

mit der Integrationskonstante C allgemein lösbar. Die Integrationskonstante bestimmt sich, falls vorhanden, aus der Anfangsbedingung der Differenzialgleichung $y(a) = b$, so dass sich in eindeutiger Weise eine spezielle Lösung für die Funktion $y(x)$ ergibt.

II. Wir formen unter Trennung der Variablen wie folgt um:

$$y' = x^2 y \quad (\text{Ersetzen: } y' = \frac{dy}{dx})$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 y \quad | \cdot dx$$

$$dy = x^2 y dx \quad | :y$$

$$\frac{dy}{y} = x^2 dx \quad (\text{Variablen getrennt, Integration})$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int x^2 dx + C \quad (\text{Integralbestimmung})$$

$$\ln|y| = \frac{1}{3} x^3 + C \quad | e^{(\cdot)}$$

$$y = e^{\frac{1}{3}x^3 + C} \quad (\text{Anwendung der Potenzgesetze, Integrationskonstante } C_1)$$

$$y = C_1 \cdot \sqrt[3]{e^{x^3}}$$

Die gesuchte allgemeine Lösung der Differenzialgleichung ist also:

$$y = C_1 \cdot \sqrt[3]{e^{x^3}}, C_1 > 0.$$