

Mathematikaufgaben

> Analysis

> Ganz rationale Funktionen 4. Grades

Aufgabe: Zeige: Jede ganz rationale Funktion 4. Grades $f(x)$ besitzt mindestens einen Extrempunkt.

Lösung: I. Für eine ganz rationale Funktion $g(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ n. Grades gilt hinsichtlich der Hochpunkte, Tiefpunkte (Anzahl maximal n-1; Gleichung $g'(x) = 0$ lösen, Lösungen in $g''(x)$ einsetzen):

a) $g'(x) = 0 \rightarrow x_1, x_2, \dots$

b) $g''(x_1) < 0 \rightarrow H(x_1|g(x_1))$ oder $g''(x_1) > 0 \rightarrow T(x_1|g(x_1))$; $g''(x_2) < 0 \rightarrow H(x_2|g(x_2))$ oder $g''(x_2) > 0 \rightarrow T(x_2|g(x_2))$; ... oder:

c) Vorzeichenwechsel von $g'(x)$ von + nach - bei $g'(x_1) = 0 \rightarrow H(x_1|g(x_1))$ oder: Vorzeichenwechsel von $g'(x)$ von - nach + bei $g'(x_1) = 0 \rightarrow T(x_1|g(x_1))$; Vorzeichenwechsel von $g'(x)$ von + nach - bei $g'(x_2) = 0 \rightarrow H(x_2|g(x_2))$ oder: Vorzeichenwechsel von $g'(x)$ von - nach + bei $g'(x_2) = 0 \rightarrow T(x_2|g(x_2))$; ...

II. Jede ganz rationale Funktion 4. Grades $f(x)$ ist von der Form:

$$f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e, a \neq 0.$$

Für die 1. Ableitung gilt dann:

$$f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d.$$

Wir untersuchen nachfolgend die 1. Ableitung $f'(x)$ als ganz rationale Funktion 3. Grades ($g(x)$).

III. Gemäß der höchsten Potenz x^3 von $f'(x)$ gilt:

$a > 0$: $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$

$a < 0$: $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$.

D.h. aber: Die Kurve von $f'(x)$ muss im Verlauf der y-Werte von $-\infty$ nach $+\infty$ bzw. von $+\infty$ nach $-\infty$ (bei x von $-\infty$ nach $+\infty$) auf jeden Fall die x-Achse schneiden, also mindestens eine Nullstelle x_0 mit $f'(x_0) = 0$ besitzen (Zwischenwertsatz für stetige Funktionen). Damit ist die notwendige Bedingung für die Existenz eines Extrempunktes von $f(x)$ erfüllt.

IV. Betrachtet man noch zudem, dass (ohne Beschränkung der Allgemeinheit) die Nullstelle x_0 noch einen Vorzeichenwechsel bei $f'(x)$ besitzen muss, so ist auch hinreichende Bedingung des Vorzeichenwechsels von $f'(x)$ erfüllt, so dass an der Stelle x_0 in der Tat ein Hoch- oder Tiefpunkt als Extrempunkt von $f(x)$ vorliegen muss.

V. Die letzte Überlegung wird auch dadurch klar, dass die 1. Ableitung $f'(x)$ als ganz rationale Funktion in einer Produktform darstellbar ist. Und zwar gelten die sich gegenseitig ausschließenden Darstellungen:

a) $f'(x) = 4a(x-x_0)^3 \rightarrow$ dreifache Nullstelle x_0 mit Vorzeichenwechsel

b) $f'(x) = 4a(x-x_0)(x-x_1)^2 \rightarrow$ einfache Nullstelle x_0 mit Vorzeichenwechsel, doppelte Nullstelle $x_1 \neq x_0$

c) $f'(x) = 4a(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \rightarrow$ einfache, paarweise verschiedene Nullstellen x_0, x_1, x_2 jeweils mit Vorzeichenwechsel

d) $f'(x) = 4a(x-x_0)(x^2+px+q) \rightarrow$ einfache Nullstelle x_0 mit Vorzeichenwechsel, quadratische (irreduzible) Parabel $y=x^2+px+q$ ohne Nullstelle.